ОГЛЯД МАТЕРІАЛІВ 26 КОНГРЕСУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ ТА КОЛЕДЖУ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 8-10 БЕРЕЗНЯ 2018 ПАРИЖ, ФРАНЦІЯ

Вознюк А.В.

26th European Congress of the European Board & College of Obstetrics and Gynaecology
Palais des Congrès de PARIS
March 8-10, 2018
EBCOG
European Board & College of Obstetrics and Gynaecology

ІНДУКЦІЯ ПОЛОГІВ

- Механічні методи:
- Амніотомія
- Природні осмотичні дилятатори
- **Синтетичні осмотичні дилятатори(Dilapan-S**)
- **Балонний катетер(СООС)**

Успішно використовується у жінок із рубцем на матці

- Фармакологічні методи:
- Вагінальний або ендоцервікальний PGE2(Динопрстон)
- Пероральний або вагінальний PGE1(Мізопростол)
- **Міфепристон (ТІЛЬКИ при внутрішньоутробній загибелі плода)**
- Окситоцин

БАЛОННИЙ КАТЕТЕР (COOC®)



DILAPAN-S

Dilapan-S®
HYGROSCOPIC CERVICAL DILATOR
DILAPAN - S
The Hygroscopic Cervical Dilator

ОКСИТОЦИН. ЧОМУ ВІН НЕ ЗАВЖДИ ПРАЦЮЄ??

- Пологи для матки за рівнем стресу = подолати Олімпійський марафон для атлета
- Всі м‘язи під час роботи, як і матка, продукують лактат
- Лактат – індикатор погано оксигенованого м‘язу, який в свою чергу призводить до зменшення сили маткових скорочень


The uterus is like any other muscle
If exhaustion is too significant, no additional stimulation will have effect ...

AFL(ЛАКТАТ АМНІОТИЧНОЇ РІДИНИ)



1. Obtain amniotic fluid

2. Probe placement



3. Place sample

4. Read value

Name
XXXXXXXXXX
Identification
XXXX
Date and Time
2008-03-26 11:29
mmol/l
20
15
10
5
Ovan B.inj
Vid B.inj
Ovan sprn
Vid sprn
Med sprn
Blick-bete
Retr
(cm) 10
9
8
7
6
5
4
3
2
Cervix
12.3
13.2
12.1
14.5
08:28
Sectio
Time
10.00
15.00
20.00
01.00
06.00
10.00
2008-03-26
2008-03-27

PATIENT 1 - High AFL





Oxytocin infusion is stopped: AFL level from 14,9 to 10,4 in 1,5 hours

4,5 hours of infusion, 180 ml - infusion stopped. Spontanous delivery with own contractions.

ObsteCare

PATIENT 2 - Low AFL



- Oxytocin low dose
- Increased when AFL is normal
- Reduction due to child
- Partus Normalis

ObsteCare

БАЛОН БАКРІ(COOK®)



ПРОФІЛАТИКА СДР

- Бетаметазон 24мг
- Дексаметазон 24мг

} з 24-34 тиждень

- Після 34 тижнів можливий курс профілактики СДР при імовірному плановому розродженні шляхом кесарського розтину до 38 тижнів.

СТЕРИЛІЗАЦІЯ ПІД ЧАС КЕСАРСЬКОГО РОЗТИНУ

- **Двостороння сальпінгектомія** - для попередження раку яєчників (при технічній можливості)

ТАЗОВЕ ПЕРЕДЛЕЖАННЯ(LOUWEN)

- МР-пельвіометрія всім першонароджуючим із тазовим пердлежанням

- Покази до кесарського розтину:
  - очікувана маса плода 3800,0 і більше
  - Низька очікувана вага плода(менше 10 центилю)
  - ножне передлежання плода;
  - розгинання голівки плода III ступеня за даними УЗД;
  - «Докази загрозливого стану плода»

МАЙСТЕР КЛАС: ВІДНОВЛЕННЯ РОЗРИВІВ ПРОМЕЖИНИ 3-4 СТУПЕНЯ

УМОВИ УЧАСТІ

- Підписано тристоронній Меморандуму про співпрацю між Асоціацією акушерів-гінекологів України (***ААГУ***), Європейською Радою та Коледжем з Акушерства та Гінекології (***EBCOG***) та групою компаній Кусум (***Kusum Healthcare Private Limited***).
- Згідно із цим Меморандумом ми будемо мати змогу сприяти поширенню європейського досвіду надання медичної допомоги жіночому населенню
- Запланована низка наукових, навчальних і практичних заходів на період протягом найближчих 5 років.
- Фінансування зазначених витрат приймає на себе група компаній Кусум.



www.aagu.com.ua

European Board & College Obstetrics and Gynaecology

EBCOG

Kusum Healthcare

Quality and Health for All

Вагінальні супозиторії від Кусум
з любов'ю до жінки!
НОВИНКА!
Дермазол
Кетоконазол
1 супозиторій містить:
кетоконазолу.....400 мг
5 (5x1)
МІСТОЛ®
Метронідазол
1 супозиторій містить:
метронідазолу.....500 мг
Протимікробний та антисептичний засіб, що застосовується у гінекології.
10 (5x2)
ГАЙНЕКС®
ГАЙНЕКС® ФОРТЕ

НОВИНКА!

Комфортне лікування
вагінального кандидозу

Дермазол –

єдині в Україні вагінальні супозиторії кетоконазолу на гідрофобній основі (твердий жир), що забезпечує

комфортне лікування
вагінального кандидозу

- відсутнє виражене витікання розчинної основи
- відсутнє зневоднення та сухість слизової оболонки піхви
- відсутня неповна розчинність основи в піхві

НОВИНКА!

Зручне лікування

бактеріального вагінозу і трихомонадного кольпіту

500 мг метронідазолу – всього 1 супозиторій на добу!

Показання	Дозування препарату	Тривалість лікування
Неспецифічні вагініти	1 супозиторій на добу	7 днів
Трихомонадний вагініт		10 днів

ГАЙНЕКС® ФОРТЕ, ГАЙНЕКС® – РАЦІОНАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ВАГІНІТІВ ЗМІШАНОЇ ЕТІОЛОГІЇ

Дякую за увагу!